

โทษและพิษภัยของสารเสพติด

1. ต่อผู้เสพ ทำให้สุขภาพทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดโรคต่าง ๆ
2. ต่อครอบครัว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สูญเสียรายได้ เกิดความไม่สงบ สุขภายในครอบครัว
3. ต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
4. ต่อประเทศชาติ ทำให้สูญเสียเศรษฐกิจจำนวนมาก และบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

ยาเสพติดในปัจจุบัน


แอล เอส ดี (LSD) ...กระดาศเมมา

..ยาเสพติดซึ่งเคยระบาดเมื่อประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา

..... แอล เอส ดี (LSD) มีชื่อเต็มว่า **Lysengic Acid Dicity Lamide** เป็นสารกึ่งสังเคราะห์ ที่ไม่พบในธรรมชาติ มักเรียกว่า เมจิกเปเปอร์ หรือ กระดาศเมมา จัดอยู่ในประเภทยาหลอนประสาท มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว โดยมีรูปแบบต่าง ๆ กันเช่น รูปน้ำตาลก้อน รูปแคปซูล เม็ดยา หรือในรูปของกระดาศฉับ (**Blotter paper**)

ยาเสพติดในปัจจุบัน

ซึ่ง แอล เอส ดี ในรูปกระดาษพับเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เสพยาที่สุด เนื่องจากสะดวกต่อการพกพา หรือหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ กระดาษพับ 1 แผ่นสามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 ชิ้นขึ้นไป โดยชิ้นเล็ก ๆ เหล่านี้ จะพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ คล้ายกับแสตมป์



ยาเสพติดในปัจจุบัน

แอล เอส ดี(LSD) เป็นสารฤทธิ์หลอนประสาทแรงมากที่สุด ตัวหนึ่ง ในกลุ่มสารหลอนประสาทด้วยกัน มีความรุนแรงในการออกฤทธิ์ต่อสมองสูง โดยในระยะแรกจะมีความสุข อารมณ์ดี รู้สึกคึกคัก ความดันโลหิตสูง หลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง มีอาการหวาดกลัว จนกระทั่งอาจทำร้ายตนเอง หรือนำไปสู่การฆ่าตัวตาย โดยที่ผู้นั้นไม่สามารถยับยั้งตนเองได้เลย



ยาเสพติดในปัจจุบัน

. ในคนที่ใช้ แอล เอส ดี มาก ๆ จะเกิดอาการโรคจิตอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากเดิม แอล เอส ดี (**LSD**) มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงอยู่แล้ว เมื่อใช้ในปริมาณมาก ๆ จะเกิดอาการโรคจิต ชนิดหวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอนที่น่ากลัวต่าง ๆ แม้จะหยุดใช้ยาแล้วก็ตาม แต่อาการโรคจิตก็อาจกลับมาได้อีก ซึ่งอาการดังกล่าว จะรักษาให้หายได้ยากมาก และต้องใช้เวลาหลายปี อาการจึงจะทุเลาลง

ยาเสพติดในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การที่ แอล เอส ดี (LSD) กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบหายไปเกือบ 10 ปีนั้น สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลักลอบนำเข้ามาเสพ เพื่อผลทางการหลอนประสาท จนกระทั่งขยายผลแพร่ระบาดออกไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทุก ๆ คนในสังคม จึงควรร่วมมือกัน ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของแอล เอส ดี (LSD) มิให้เป็นภัยต่อเยาวชนของเรา

ยาเสพติดในปัจจุบัน

การวิจัยการสูบบุหรี่

ได้มีการวิจัยและพิสูจน์ชัดเป็นที่รู้ทั่วไปแล้วว่าบุหรี่เป็น โดยการตรวจเนื้อปอด ของผู้มีสุขภาพปกติ ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จำนวน 200 ราย ใช้วิธีตัดปอดเป็นแผ่นบาง ขนาด 0.4 มิลลิเมตร ตัดบนกระดาษ (**paper-mounted whole lung section**) เพื่อศึกษาการเกิด ภาวะถุงลมปอดโป่งพอง ในคนสุขภาพปกติ พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ 133 ราย มีถุงลมโป่งพอง 55 ราย (41.6 %) ในขณะที่ ผู้ไม่สูบบุหรี่ 59 ราย พบมีถุงลมโป่งพองเพียง 4 ราย (6.8 %)

ยาเสพติดในปัจจุบัน

แสดงว่า บุหรี่ทำให้เกิดการโป่งพอง ของถุงลมปอดแน่นอน แม้ยังไม่มีอาการ แสดงออกมาก็ตาม ในปัจจุบันอุบัติการณ์โรคปอดกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก และ พบมากในวัยหนุ่มสาว มากกว่าในอดีต สาเหตุหนึ่งมาจาก การเกิดวัณโรคในผู้ติดเชื้อ **HIV** ในขณะเดียวกัน แม้จะมีการรณรงค์ ให้งดการสูบบุหรี่ อยู่ต่อเนื่องตลอดมา แต่ก็ยังมีคนวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก นิยมสูบบุหรี่อยู่ เป็นที่น่าสนใจว่า การสูบบุหรี่ กับวัณโรค จะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่

ยาเสพติดในปัจจุบัน

อีกผลการศึกษาวิจัยได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า บุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีบุตรยาก จากผลของบุหรี่หลายประการต่อระบบการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ บุหรี่ทำให้เพิ่มจำนวนตัวอสุจิที่มีรูปร่างพิกลพิการ บุหรี่ทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนลดลง โอกาสตั้งครรภ์จึงลดลง ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีอัตราการตั้งครรภ์โดยรวมลดลง ฯลฯ

แม้ว่าจะยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่จะบอกแน่นอนว่า บุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกโดยตรง เนื่องจากพบว่า ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่นั้นมักจะผ่านการมีเพศสัมพันธ์ กับชายมากกว่าหนึ่งคน และคนที่สูบบุหรี่ส่วนหนึ่ง มีโอกาสติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่น หูดหงอนไก่ และเชื้อเริม ซึ่งเชื่อกันว่า อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก แต่แน่นอนว่า บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่ทำให้คุณผู้หญิงไปสู่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอื่น